



# Fondazione Opera San Camillo

---

CORSO DI FORMAZIONE INTERNA  
EMERGENZA COVID-19  
1° aggiornamento

*Direzione Sanitaria Aziendale*



# 1. FOTOGRAFIA EPIDEMIOLOGICA

---

- Ministero della Salute

[http://www.salute.gov.it/  
nuovocoronavirus](http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus)

## 2. DEFINIZIONI (Circolare MS 9 mar)

---

### **CASO SOSPETTO DI COVID 19 CHE RICHIEDE ESECUZIONE DI TEST DIAGNOSTICO**

1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) **e** senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica **e** storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale \* durante i 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi;

**oppure**

2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta **e** che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi;

**oppure**

3. Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) **e** che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) **e** senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica.

## 2. DEFINIZIONI (Circolare MS 9 mar)

---

### **CASO PROBABILE**

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

### **CASO CONFERMATO**

Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di riferimento nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento che rispondano ai criteri indicati in Allegato 3, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

## 2. DEFINIZIONI (Circolare MS 9 mar)

---

### **CONTATTO STRETTO**

- Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;

## 2. DEFINIZIONI (Circolare MS 9 mar) (segue)


---

### **CONTATTO STRETTO**

- Un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di *14 giorni prima dell'insorgenza della malattia* nel caso in esame.

# 3. COMPORTAMENTI PRECAUZIONALI



Ministero della Salute

nuovo coronavirus

Dieci comportamenti da seguire

- 1 Lavati spesso le mani
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
- 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

# 3. COMPORTAMENTI PRECAUZIONALI

6

Pulisci le superfici  
con disinfettanti a base di cloro o alcol

7

Usa la mascherina solo se sospetti  
di essere malato o se assisti persone malate

8

I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti  
dalla Cina non sono pericolosi

9

In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso:  
chiama il tuo medico di base e se pensi di essere  
stato contagiato chiama il 112.

10

Gli animali da compagnia non diffondono  
il nuovo coronavirus

Testi rielaborati dalla Task Force Comunicazione ISS su fonti di: OMS, ECDC e ISS

© Istituto Superiore di Sanità - 24 febbraio 2020

Progetto grafico: Servizio Comunicazione ISS - 24 febbraio 2020



## 4. INDICAZIONI REGIONALI

---

- Ministero della Salute

[http://www.salute.gov.it/portale/  
nuovocoronavirus/  
archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp](http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp)

# 5. UTILIZZO DPI (ISS rapp. 2/2020)

Contesto di lavoro	Destinatari dell'indicazione (operatori/pazienti)	Attività	Tipologia di DPI o misure di protezione
<b>Arete di degenza</b>			
<b>Stanza di pazienti COVID-19<sup>2</sup></b>	Operatori sanitari (Si raccomanda riduzione al minimo del numero di operatori esposti; formazione e addestramento specifici)	Assistenza diretta a pazienti COVID 19	Mascherina chirurgica Camice monouso /grebiule monouso Guanti Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera
		Procedure che generano aerosol	FFP2 o FFP3 Camice /grebiule monouso idrorepellente Guanti Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera
		Esecuzione tampone oro e rinofaringeo	FFP2 o mascherina chirurgica se non disponibile Camice monouso Occhiali di protezione (occhiale a mascherina/visiera) Guanti
	Addetti alle pulizie (Si raccomanda riduzione al minimo del numero di addetti esposti; formazione e addestramento specifici)	Accesso in stanze dei pazienti COVID-19	Mascherina chirurgica Camice /grebiule monouso Guanti spessi Occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche) Stivali o scarpe da lavoro chiuse
	Visitatori (necessario limitare l'accesso) <sup>3</sup>	Accesso in stanze dei pazienti COVID-19, qualora eccezionalmente permesso	Mascherina chirurgica Camice monouso Guanti

## 5. UTILIZZO DPI (ISS rapp. 2/2020)

---

- Praticare frequentemente *l'igiene delle mani* con acqua e sapone o, se questi non sono disponibili, con soluzioni/gel a base alcolica;
- evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
- tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;
- indossare la *mascherina chirurgica* nel caso in cui si abbiano sintomi respiratori ed eseguire l'igiene delle mani dopo avere rimosso ed eliminato la mascherina;
- evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di *almeno un metro* dalle altre persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori.

## 5. UTILIZZO DPI (ISS rapp. 2/2020)

---

La selezione del tipo di DPI deve tenere conto del rischio di trasmissione di COVID-19; questo dipende da:

- *tipo di paziente*: i pazienti più contagiosi sono quelli che presentano tosse e/o starnuti; se tali pazienti indossano una mascherina chirurgica o si coprono naso e bocca con un fazzoletto la contagiosità si riduce notevolmente (diffusione per droplets);
- *tipo di contatto assistenziale*: il rischio aumenta quando il contatto è ravvicinato ( $< 1$  metro) e prolungato ( $> 15$  minuti) e quando si eseguono procedure in grado di produrre aerosol delle secrezioni del paziente (nebulizzazione di farmaci, intubazione, rianimazione, induzione dell'espettorato, broncoscopia, ventilazione non invasiva).

## 5. UTILIZZO DPI (Circolare MS 22 febb)

---

### PER ASSISTENZA AL P.TE CoVid19 positivo Vestizione nell'antistanza/zona filtro

1. Togliere ogni monile e oggetto personale. PRATICARE L'IGIENE DELLE MANI con acqua e sapone o soluzione alcolica
2. Controllare l'integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri
3. Indossare un primo paio di guanti
4. Indossare sopra la divisa il camice monouso
5. Indossare idoneo filtrante facciale
6. Indossare gli occhiali di protezione
7. Indossare secondo paio di guanti

## 5. UTILIZZO DPI (Circolare MS 22 febb)

---

### Svestizione nell'antistanza/zona filtro

- Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute
- I DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore nell'area di svestizione
- Decontaminare i DPI riutilizzabili

Rispettare la sequenza indicata:

1. Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore
2. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore
3. Rimuovere gli occhiali e sanificarli
4. Rimuovere la maschera FFP2/FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore
5. Rimuovere il secondo paio di guanti
6. Praticare l'igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone

## 6. PROVVEDIMENTI INTERNI (fino al 3 aprile)

---

- Divieto di accesso dei visitatori esterni eccetto casi specifici selezionati dalla Direzione Sanitaria;
- Limitazione delle uscite dalla struttura ai casi straordinari;
- Filtro in ingresso per ogni persona che accede alla struttura, costituito da questionario, segnalazione di eventuali segni/sintomi (febbre, rinorrea, tosse), lavaggio delle mani.